

disajikan survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dari 16.380 anak yang disurvei sebanyak 14% bayi mengalami penyakit diare

(Astari, 2012). Hasil survey morbiditas diare menunjukkan penurunan angka kesakitan penyakit diare yaitu dari 423 per 1.000 penduduk pada tahun 2006 turun menjadi 411 per 1.000 penduduk tahun 2010 (Profil Kesehatan Indonesia, 2012) Hasil Riskesdas 2007 diperoleh bahwa diare merupakan penyebab kematian bayi yang terbanyak yaitu 42%.. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan Destritania (2007) di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir II Palembang, didapatkan 97% bayi usia kurang dari dua bulan telah mengkonsumsi susu formula. Data mengenai kejadian diare dari Dinas Kesehatan Kota Jambi diketahui bahwa jumlah penderita diare di wilayah puskesmas kenali besar sebanyak 1.003 kasus diare yang ditangani. Diketahui juga bahwa jumlah penderita diare pada tahun 2012 pada balita sebanyak 4257 kasus dan anak < 1 tahun sebanyak 1.403 jiwa yang tersebar di 20 Puskesmas. Pada wilayah kerja Puskesmas kenali Besar diare pada anak < 1 tahun sebesar 110 jiwa. Sedangkan pemberian ASI eksklusif sebanyak 67 jiwa (22,2%)

Di Indonesia, diare adalah salah satu penyebab kematian dan kesakitan tertinggi pada bayi urutan ketiga sedangkan di Negara berkembang diare merupakan penyakit endemis serta kematian nya sangat tinggi, sebagai gambaran 17% kematian anak di dunia disebabkan oleh diare. Selama 18 tahun terakhir angka kematian bayi (AKB) sudah turun sebesar 44% dari 57 kematian per 1.000 kehiran hidup (Sari, 2017)

Dari uraian diatas maka Preview tertarik untuk mengambil judul *literature review* : Hubungan Penyajian Susu Formula Dengan Kejadian Diare Pada Bayi Usia 0-6 Bulan

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penyajian susu formula dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 Berdasarkan Studi *Literatur Review*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mencari persamaan, kelebihan, dan kekurangan Hubungan penyajian susu formula dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan berdasarkan Studi *Literatur Review*

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mencari persamaan, kelebihan, dan kekurangan karakteristik responden berdasarkan bayi Diare pada studi *Literatur Review*
- b. Untuk mencari persamaan, kelebihan, dan kekurangan cara-cara Penyajian dan Pemberian Susu Formula pada studi *Literatur Review*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi Poltekkes Jurusan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi tambahan yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa keperawatan serta dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Hubungan Penyajian Susu Formula Dengan Kejadian Diare Pada Bayi Usia 0-6 Bulan.